

参 考

ヒブワクチン 接種スケジュール

該当月（年） 齢 生後2か月～5歳未満

接種開始月齢やその後の受け方によりワクチンの接種回数が変わりますのでご注意ください。

接種量 毎回0.5ml 皮下接種

標準的な接種開始時期

①生後2月～7月未満

初回1回目

27日以上標準的には56日までの間隔をおく
※医師が認める場合は20日以上

初回2回目

27日以上標準的には56日までの間隔をおく
※医師が認める場合は20日以上

初回3回目

1歳誕生日前日までに初回3回目までを接種、1歳を超えての初回接種は行わない。
その場合は初回接種の最終日から27日以上（※医師が認める場合は20日以上）の間隔をおいて、追加接種を1回行うこと。

7か月以上標準的には13か月までの間隔をおく

追加接種1回

標準的な接種開始時期を逃した場合

②生後7月当日～12か月未満

初回1回目

27日以上標準的には56日までの間隔をおく
※医師が認める場合は20日以上

初回2回目

1歳誕生日前日までに初回2回目を接種、1歳を超えては行わない。
その場合は初回1回目から27日以上（※医師が認める場合は20日以上）の間隔をおいて、追加接種を1回行うこと。

7か月以上標準的には13か月までの間隔をおく

追加接種1回

③1歳誕生日～5歳未満

1回接種のみ



参 考

小児肺炎球菌ワクチン 接種スケジュール

該当月（年） 齢 生後2か月～5歳未満

接種開始月齢やその後の受け方によりワクチンの接種回数が変わりますのでご注意ください。

接種量 毎回0.5ml 皮下接種

標準的な接種開始時期

①生後2月～7月未満

初回1回目

27日以上の間隔をおく
初回2回目は1歳誕生日前日まで
初回2回目が1歳を超えた場合の初回3回目は行わない。その場合、初回2回目接種日から60日以上の間隔をおいて、追加接種を1回行うこと。

初回2回目

27日以上の間隔をおく
初回3回目は2歳誕生日前日まで
初回3回目が2歳を超える場合は行わない。その場合、初回2回目接種日から60日以上の間隔をおいて、追加接種を1回行うこと。

初回3回目

60日以上の間隔をおく
※1歳以降で標準的には生後12～15か月の間

追加接種1回

標準的な接種開始時期を逃した場合

②生後7月当日～12か月未満

初回1回目

標準的には生後12月までに27日以上の間隔をおく

初回2回目は2歳誕生日前日まで
初回2回目が2歳を超える場合は行わない。その場合、追加接種を1回行うこと。

初回2回目

60日以上の間隔をおく
※1歳以降に接種

追加接種1回

③1歳誕生日～2歳未満

1回目

60日以上の間隔をおく

2回目

※2回で終了

④2歳誕生日～5歳未満

1回接種のみ

①で開始の場合、初回3回接種を行うには初回2回目を1歳誕生日前日までに1回行う必要があります。この場合、さらに初回3回目接種は、2歳誕生日前日までとなります。